


CUADERNO DE CULTIVO SPAG-FRUTALES

F-05F Rev:8 7-03-17		NOMBRE		Nº SOCIO	
		MUNICIPIO		VARIEDAD	
		POLIGONO		HG	
		PARCELA		AFORO	
		PARTIDA		AGUA DE	

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

MOTIVO APLICACIÓN	CULTIVO	MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Nº REG	LITROS GASTADOS	Dosis L/ 1000	P.S	fechas
Piojo de San José	m,c,a	Aceite de parafina 83%	Agroaceite, Volck	19629 12424		10	NP	
Piojo de San José	m,c	Piriproxifen 10 %	Muligan, Juvinal	24089 19675		0,4	NP 14	
Cribado, monilia,abolladura	m,c,a	Oxicloruro Cobre 50 %	Codimur 50 Beltasur500	23622 11582		3-4	NP	
Cribado,abolladura	m,c,a	Tiram 50%	Tisar-50 flow	19854		3,5-5	15	
Pulgones	m,a	Imidacloprid 20%	Confidor Nuprid	19120 24579		0,5	15	
Pulgones	m	Tiametoxam 25 %	Actara...	23093		0,1	14	
Pulgones	m	Clotianidina 50%	Dantop	24109		0,12	14	
Pulgones	m	Pirimicarb 50%	Aphox Kilsec	11826 23603		1	7	
Pulgones	m,c,a	Tau fluvalinato 10%	Klartan	23858		0.2	NP / 21 (ciruelo)	
Trips	m,c,a	Acrinatrín 7,5 %	Rufast	21614		0,6- 0,7	14	
Trips, P.SanJosé	m	Metil-clorpirifos 22,4%	Reldan E	12211		0,4	15	
Trips, Cydia	m	Spinosad 48%	Spintor	22839		0.250	7	
Oidio	m,a	Penconazol20 %	Topas 200EW	21291		0,25	14	
Oidio	m	trifloxistrobin	Flint	22338		0.15	7	
Oidio	m,a,c	Miclobutanil 24%	Sythane Forte	22563		0,25	7	
Oidio	m,a,c	Miclobutanil 12,5%	Fungiben	24285		0,5	7	
Oidio	m,a,c	Ciproconazol 10%	Caddy 10	18736		0,2	14	
Oidio	m,a	Bupirinato 25 %	NimrodQuatro	13261		0,5	15	
Monilia,oidio,aboll	m,a	Difenoconazol 25%	Score 25	18.767		0.2- 0.3	7	
Monilia,oidio	m,c,a	Metil-tiofanato 70%	Topsin 70 WG	22044		0.5-1	3/14	
Monilia	m,a	Clortalonil 50%	Daconil	21795		3	15	
Monilia	m,a	Ciprodinil 50%	Chorus	24443		0.5	7	
Oidio, araña	m,c,a	Azufre 80%	Kumulus DF	18992		2-5	NP	
Araña roja	m,c,a	Hexitiazox 10 %	Perfil, Cesar	24206 17014		0,5	14	
Araña roja	m,c,	Etoxazol 11%	Borneo	23433		0,4	14	
Araña roja	m,c,a	Fenpiroximato 5%	Flash	19241		1-2	14	
Ceratitís	m,c,a	Lambda Cihalotrin 10%	Karathe ZEON	22398		0,1	7	

Observaciones: En caso de usar un producto comercial que no aparezca en el listado, consultar al técnico.	Indicar pol y parc en caso de caldo sobrante en algún tratamiento:
	Maquinaria de aplicación (indicar marca / modelo ó código del equipo empleado): <input type="checkbox"/> Mochila: <input type="checkbox"/> Turbo: <input type="checkbox"/> Otros:

CUADERNO DE CULTIVO SPAG-FRUTALES

TRATAMIENTOS HERBICIDAS

MOTIVO APLICACIÓN	MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Nº REG	GASTO LITROS O MOCHILAS	DOSIS MOCHILA (cc)	DOSIS MOCHILAS	DOSIS POR 100 L	FECHAS
Sin fruta	Glifosato 36%	Barbarian super 360 Touchdown	25728 22957		250	500	1250	
Postemergencia Preemergencia	(1)Glifosato 16% + Diflufenican 4%	Zarpa	19658		200	400	1000	
Contacto	Glufosinato amónico	Finale	18770		150		750	
Pre-emergencia	(1)Oxifluorfen 24%	Fenfen	23917		100		600	

Indicar las condiciones meteorológicas durante la aplicación.	FECHA							
	Buen tiempo							
	Viento							
	Lluvia							
	Frío							
	Otros(especificar)							

En caso de usar un producto comercial Que no aparezca en el listado, consulta Al Dpto. Técnico.	Indicar pol y parc en caso de caldo sobrante en algún tratamiento:
	Seleccionar la máquina utilizada (Indicar marca / modelo y/o código del equipo: : <input type="checkbox"/> M. PILAS <input type="checkbox"/> M. tipo MATABI <input type="checkbox"/> TANQUE con barra herbicida

(1)Estos herbicidas se deben usar cuando el árbol no tiene hoja. El glifosato se debe usar en invierno, con el árbol en latencia, o cuando ya no hay fruta (teniendo mucho cuidado de que no haya deriva).
 Con fruta en el árbol usar solo Glufosinato amónico.

Fecha posible 1ª recolección:	(Fecha tratamiento + P.S + 1 día)
-------------------------------	-----------------------------------

Firma del técnico Juan Quiles	Fecha de revisión 	Nombre y Firma del productor/aplicador: Godelleta a _____ de _____ de _____
--	-----------------------------------	--